

PLANS D'ALIMENTATION INDICATIFS



pour **AGNEAUX** et **CHEVREAUX**

Distribution à volonté

AGNEAUX

170 g/L de buvée,
ou
180 à 200 g/L d'eau

CHEVRETTES d'ELEVAGE

135 g/L de buvée,
ou
140 à 160 g/L d'eau

CHEVREAUX de BOUCHERIE

150 g/L de buvée,
ou
140 à 190 g/L d'eau

Distribution rationnée

Semaine	Agneaux Chevrettes d'élevage		Chevreaux de boucherie	
	Nbe repas /jour	L de buvée /jour	Nbe repas /jour	L de buvée /jour
1	3	1	3	1
2	2	1.5	2	1.5
3	2	2	2	2
4 et 5	2	2.5	2	2.5
6 et 7	2	2.5	-	-
8	2	1.5	-	-
9	1	1	-	-

↓
Remarque :

A partir de la 6^{ème} semaine, diminuer progressivement la distribution de lait pour permettre aux jeunes animaux de consommer davantage d'aliment concentré et préparer ainsi le sevrage 2 ou 3 semaines plus tard.

Conseils d'Utilisation



Alimentation rationnée au seau à tétines ou au **nourrisseur automatique** :

Nettoyer et désinfecter tous les jours à l'eau de javel le matériel de préparation et de distribution.



T° eau
45 / 50°C



PESER la quantité d'aliment d'allaitement nécessaire à la buvée et la verser dans le seau.
Bien respecter la **concentration**.



AGITER
brièvement (20 à 30 sec.)

Distribuer à horaires réguliers, de 40 à 45°C.

Stocker l'aliment dans un endroit sec et bien refermer les sacs entamés entre 2 préparations. Évitez les souillures extérieures.

Remarques :
Attention à la qualité de l'eau (vérification par analyse).

MADE IN FRANCE

Assistance et Conseils Éleveurs
N° Vert 0 800 507 499

 **Univor Agnodor**

Suivez-nous sur

